



Brigade Verte

Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin

Les domaines d'intervention des gardes champêtres du secteur de Walheim sont très variés : un troupeau de moutons en divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, l'incinération de végétaux, de papiers ou plastiques, des plaintes suite à l'utilisation d'une tondeuse les jours fériés, des infractions en matière de chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les espaces naturels, ... la liste est longue et non exhaustive ! Mais intéressons-nous aujourd'hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :

Les plantes invasives

LA BERCE DU CAUCASE

Comme son nom l'indique, cette plante est originaire du Caucase. Excellente fourragère, Staline a convaincu les paysans russes d'en planter, jusqu'à ce que sa toxicité soit prouvée.

En effet cette magnifique ombelle blanche, pouvant atteindre 4 mètres de hauteur, dont la sève est photo sensibilisante, peut provoquer de graves brûlures.

Reconnaitre la plante

Plante herbacée, pouvant atteindre entre 2 et mètres de hauteur, elle aime l'humidité et affectionne particulièrement le bord des cours d'eau. Les fleurs sont des ombelles d'un diamètre impressionnant composées de quantité de petites fleurs blanches. Les feuilles peuvent atteindre 1 mètre de long sur 50 cm de large. Les tiges d'un diamètre de 5 à 10 cm, sont cannelées, souvent tachetées de pourpre et couvertes de poils blancs.

Les fruits sont des diakènes, secs, ovales et largement ailés, à odeur de résine.

Méthode de lutte

Ne « cultivez » pas cette plante et informez les propriétaires de jardins et les riverains des risques pour la santé et la biodiversité.

Pour cette plante vivace, la meilleure gestion est de prélever les ombelles dans des sacs, avant que les graines ne soient mûres, et de les incinérer (surtout pas de compostage).

Pour les petits foyers ou les zones en cours de colonisation, on privilégiera l'arrachage annuel des pieds en prenant soin de prélever 10 à 20 cm de racine (pour éviter les repousses) jusqu'à épuisement de la banque de graines du sol (3 à 5 ans).

Pour les foyers plus importants, les moyens se concentreront sur le contrôle de la montée en graine avec un suivi annuel : prélèvement des ombelles des individus matures, décaissement des 5-10 cm de sol superficiel et élimination adaptée des sols souillés (incinération, filtrage).

La fauche régulière ou le pâturage précoce, conseillés pour affaiblir la plante, retardent la montée en graine sans forcément l'empêcher. Ces opérations peuvent compliquer le repérage des ombelles car les individus matures sont prostrés. **Sa présence est mal connue, aidez-nous à la localiser.**



Règlementation

La présence de la Berce du Caucase modifie les milieux naturels et appauvrit la faune et la flore native. Elle se développe en forte densité et peut se disperser rapidement si les graines sont transportées le long d'une rivière.

Malgré sa dangerosité, elle ne fait l'objet, pour l'instant, d'aucune réglementation.

Toutefois, les zones colonisées sont dangereuses et doivent par conséquent être signalées.

L'AMBROISIE à FEUILLES d'ARMOISE

Cette plante est apparue en Alsace au début des années 2000.

Elle est déjà bien implantée dans d'autres régions de France, notamment en région Rhône-Alpes où elle pose de nombreux problèmes d'allergies sous forme diverses : rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire ou exéma mais aussi fatigue ou insomnie. Les symptômes apparaissent aux environs de mi-août, période à laquelle la plante libère son pollen.

6 à 12% de la population serait sensible à l'ambrosie.

Reconnaitre la plante

Elle apparaît sous forme de cotylédons entre avril et mai.

Elle pousse généralement sur les terrains vagues, les bords de route, les voies ferrées mais affectionne aussi les cultures de printemps, particulièrement le tournesol, mais aussi le maïs.



Les graines pouvant se retrouver dans les mélanges de graines pour oiseaux, surveillez les abords des mangeoires à oiseaux.

Les inflorescences apparaissent fin juin, juillet. Les fleurs de couleur jaune libèrent leur pollen vers la mi-août jusqu'à septembre.

Les tiges sont généralement poilues, fortement ramifiées, d'une hauteur de 70 cm en moyenne. Les tiges deviennent rougeâtres avec le temps.

Sa hauteur de croissance dépend de la nature du sol et de l'ensoleillement. Elle varie entre 10 et 180cm. La couleur de la face supérieure des feuilles est identique à la couleur de la face inférieure.



Méthode de lutte

Pour une efficacité maximum, la plante doit être arrachée avant la formation des graines.

Les méthodes de lutte sont variées : elles vont du simple arrachage pour quelques pieds à des solutions de broyage, binage, déchaumage ou désherbage en fonction de l'étendue ou de la nature du sol.

Règlementation

Dans le Haut-Rhin, un arrêté préfectoral du 12 octobre 2006 rend obligatoire la destruction de cette plante.

L'ambrosie est l'affaire de tous

En cas de suspicion, merci de contacter les gardes champêtres de la Brigade Verte de Walheim à l'adresse mail suivante : walheim@brigade-verte.fr